

Grad 1	Grad 2	Grad 3	Grad 4	Grad 5
nur milde Symptome; Untergruppen: - transient (< 20 min) - nur ein Organsystem, ≥ 20 min - ≥ 2 Organsysteme, ≥ 20 min	Eines (oder mehrere) der folgenden mittelschweren Symptome/Anzeichen:	Eines (oder mehrere) der folgenden Symptome/Anzeichen:	Eines (oder mehrere) der folgenden Symptome/Anzeichen:	Eines (oder mehrere) der folgenden Symptome/Anzeichen:
Hautreaktion: - 20 min - begrenzte (wenige) oder lokalisierte Nesselsucht bzw. Urtikaria - Hautrötung (einige Bereiche mit schwachem Erythem) oder leichter Juckreiz - Schwellung (z. B. Lippenödem)	Hautreaktion: - systemische Urtikaria (z.B. ausgeprägte Nesselsucht) - generalisiertes Erythem (≥ 50 % KOF) - ausgeprägter Juckreiz mit langanhaltendem Kratzen - erhebliches Angioödem (exkl. Lippenschwellung und Kehlkopfödem)	Symptome unterer Atemweg: - Bronchospasmus (z.B. pfeifende Atmung, Kurzatmigkeit), der auf Ersttherapie anspricht - Husten aufgrund Beteiligung des Kehlkopfes oder der unteren Atemwege	respiratorische Symptome: - schwerer Bronchospasmus (keine Besserung durch 2 Dosen Adrenalin i.m. ± andere geeignete Behandlung) - Stridor (mit erhöhter Atemarbeit)	respiratorische Symptome: - Atemversagen, das positive Druckbeatmung erfordert - Atemstillstand
ODER	UND/ODER	UND/ODER	UND/ODER	UND/ODER
Symptome oberer Atemweg: - nasale Symptome (z.B. Niesen, Rhinorrhoe, Juckreiz, verstopfte Nase) - Räuspern (Juckreiz im Hals) oder Engegefühl bzw. Beschwerden im Halsbereich - Husten aufgrund von Halsreizungen oder Nasenbeschwerden		Symptome oberer Atemweg oder Larynx: - Engegefühl im Hals mit heiserer Stimme - Stridor ohne erhöhte Atemarbeit - anhaltende (≥ 20 min) Odynophagie (Schmerzen beim Schlucken)	kardiovaskuläre Symptome: - Hypotonie mit Endorganstörung (z.B. Hypotonie, Schwindel, Kollaps, Synkope) ODER - RRsys-Abfall ≥ 30 % ODER - RRsys < 90 mmHg bei Erwachsenen oder bei ≤ 10 Jahre < 70 mmHg + [2 × Alter in Jahren] (CAVE: exkl. vasovagaler Ereignisse)	kardiovaskuläre Symptome: - anaphylaktischer Schock, d.h. Notwendigkeit von Vasopressoren i.v., um den RRsys auf ≥ 90 mmHg zu halten oder - MAP ≥ 65 mmHg bei Erwachsenen und Kindern > 10 Jahren (oder altersgerechter RRsys bei jüngeren Kindern) - Herzstillstand
ODER		UND/ODER		
gastrointestinale Symptome: - Übelkeit - Leichte Bauchschmerzen (z. B. ohne Veränderung des Aktivitätsniveaus)	gastrointestinale Symptome: - anhaltende (≥ 20 min) und nicht behebbar Bauchschmerzen und/oder - Erbrechen (nicht aufgrund von Würgen oder ekligem Geschmack) und/oder Durchfall	GI- & Haut-Symptome: schwere gastrointestinale Symptome zusammen mit Hautmerkmalen, die die WAO 2020-Kriterien erfüllen (z.B. starke krampfartige Bauchschmerzen, wiederholtes Erbrechen, v.a. nach Kontakt mit nicht-ingestierten Allergenen)		
ODER		UND/ODER	UND/ODER	
Sonstige: - Bindehautrötung (nicht durch Augenreiben), Juckreiz oder Tränenfluss - metallischer Geschmack		Uteruskrämpfe und/oder Uterusblutung	neurologische Symptome: - GCS < 13	